## Reduções entre problemas

**Observação:** quando você está explicando uma redução  $A \prec B$ , dada a instância (genérica)  $I_A$ , você deve explicar como **construir** a instância (específica)  $I_B$ .

**Questão 1.** Sejam  $P_1$  e  $P_2$  dois problemas tais que  $P_1 \prec_n P_2$  e suponha que  $P_1$  tem cota inferior  $\Omega(n \log n)$ , onde n é um parâmetro que mede o tamanho da entrada do problema  $P_1$ . Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Justifique cuidadosamente as suas respostas.

- (a)  $\Omega(n \log n)$  também é cota inferior para  $P_2$ .
- (b) Todo algoritmo que resolve  $P_1$  também pode ser usado para resolver  $P_2$ .
- (c) Todo algoritmo que resolve  $P_2$  também pode ser usado para resolver  $P_1$ .
- (d) O problema  $P_2$  pode ser resolvido no pior caso em tempo  $O(n \log n)$ .

**Questão 2.** Sejam  $P_1$  e  $P_2$  dois problemas tais que um deles tenha cota inferior  $\Omega(n^k)$ , para algum k > 1, e o outro é solúvel em tempo  $O(n \log n)$ . Se  $P_1$  é redutível a  $P_2$  em tempo linear, diga qual é qual. O parâmetro n denota o tamanho da entrada dos dois problemas.

**Questão 3.** Diz-se que um ponto  $p = (x_p, y_p)$  do plano **domina** um outro ponto <u>distinto</u>  $q = (x_q, y_q)$  do plano se  $x_p \ge x_q$  e  $y_p \ge y_q$ . Um ponto p é **maximal** em relação a um conjunto de pontos P se  $p \in P$  e nenhum outro ponto de  $P - \{p\}$  domina p (por favor, note que isto **não** significa que p domina todos os pontos de  $P - \{p\}$ ).

Projete um algoritmo de complexidade  $O(n \log n)$  para encontrar todos os pontos maximais de um conjunto P de n pontos no plano.

Exemplo: suponha que  $P = \{(0, n-1), (1, n-2), \dots, (n-2, 1), (n-1, 0)\}$ . Quais sãos os pontos maximais de P?

**Questão 4.** Considere o seguinte problema: dados n intervalos (fechados) na reta real, definidos pelos seus pontos de início e de fim, projete um algoritmo que lista todos os intervalos que estão contidos dentro de pelo menos um dos outros intervalos passados na entrada. O seu algoritmo deve ter complexidade  $O(n \log n)$ .

**Questão 5.** Denote por MAXIMAL o problema do exercício ?? e por INTERVAL o problema do exercício ??. Encontre uma redução de complexidade linear de MAXIMAL para INTERVAL.

É possível usar o algoritmo desenvolvido no exercício anterior e a redução proposta por você para projetar um algoritmo para MAXIMAL? Em caso afirmativo, como se compara a complexidade deste algoritmo com a do algoritmo do exercício 4?

Questão 6. Encontre uma redução de complexidade linear de INTERVAL para MAXIMAL.

**Questão 7.** Usando o conceito de dominância entre pontos do exercício ??, pode-se definir os **Pareto**s de um dado conjunto não vazio de pontos  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  no plano da seguinte forma:

- (i) o **Pareto** 1 de P, denotado por  $P_1$ , é o conjunto de pontos maximais de P;
- (ii) para  $i \ge 2$ , o **Pareto** i de P, denotado por  $P_i$ , é o conjunto de pontos maximais de  $P \setminus (P_1 \cup ... \cup P_{i-1})$ .

Chamemos de **índice de Pareto** de P o maior valor de i para o qual o **Pareto** i é não vazio. Denotemos por i(P) este valor.

Dado um conjunto P como acima, considere o problema de encontrar os i(P) primeiros Paretos de P. Projete um algoritmo  $O(n \log n)$  para este problema.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Esta lista deve ser feita logo após as aulas do conteúdo correspondente e serve para fixar o conteúdo, confirmar ou identificar as dúvidas. Anote suas dúvidas e procure atendimento! Os exercícios são referências ou transcrições de exercícios dos livros-textos (CLRS/Manber), ou foram gentilmente cedidos por outros professores, particularmente por Flávio Keidi Miyazawa (FKM), Cid Carvalho de Souza e Orlando Lee (CID/OL).

**Questão 8.** Encontre uma redução polinomial do problema de ordenação de um vetor de n elementos para o problema PARETO do exercício anterior. A sua redução deve ter complexidade O(n).

Pergunta-se: esta redução prova que o algoritmo do exercício anterior é ótimo (do ponto de vista de complexidade computacional)? Justifique sua resposta.

**Questão 9.** Seja S um conjunto de n pontos distintos do plano. Seja G = (V, E) o grafo completo onde cada vértice de corresponde a um ponto de S (ou seja, V = S). Além disso, suponha que para cada aresta (u, v) em E está associado um custo c(u, v) igual à distância euclidiana entre os pontos  $u \in V$  em S.

Mostre que o problema de encontrar uma árvore geradora mínima em um grafo G deste tipo tem cota inferior  $\Omega(n \log n)$ .

**Questão 10.** Considere dados um grafo direcionado G = (V, E), um vértice especial s em V e custos  $c(v) \ge 0$  para cada vértice v em V. Suponha que o custo de um caminho direcionado representado pela sequência de vértices  $(s, x_1, x_2, \ldots, x_k, v)$  seja dado por  $\sum_{i=1}^k c(x_i)$ , ou seja, o custo de um caminho é a soma do custo dos seus vértices internos. Assim, se (s, v) é uma aresta do grafo, o custo deste caminho é zero.

Deseja-se encontrar um caminho de custo mínimo de s para todos os vértices de  $V \setminus \{s\}$ .

Encontre uma redução polinomial deste problema ao problema do caminho mínimo usual (com custos nas arestas) visto em aula.

**Questão 11.** (difícil) Seja G = (V, E) um grafo não direcionado tal que pra cada vértice v do grafo temos associado uma função  $b(v) \leq grau(v)$ . Um b-emparelhamento é um subconjunto de E tal que cada vértice v não tem mais do que b(v) arestas incidentes a ele. Em outras palavras, um b-emparelhamento é um subgrafo gerador de G onde cada vértice v tem grau menor ou igual a b(v). Um b-emparelhamento máximo é aquele que tem o maior número de arestas possível. Reduza o problema de se achar um b-emparelhamento máximo ao problema de se achar um emparelhamento máximo em um grafo.